


Actualícese: todo lo que debe saber acerca de la PC – Hoja clorótica en Zona Norte



Diferencia en síntomas foliares entre palma sana y enferma.

Por: Luisa Fernanda Gómez,
Especialista en Comunicación de Núcleos Palmeros

La Pudrición del cogollo - Hoja clorótica (PC – HC) es una enfermedad mortal que afecta a palmas de diferentes edades. La complejidad de sus síntomas, que tienen algunas similitudes con otros disturbios patológicos y nutricionales, dificulta el diagnóstico en estados tempranos, razón por la cual, una vez las palmas son confirmadas, no tienen posibilidad de recuperación y mueren.

De acuerdo con las cifras de la Coordinación de Manejo Sanitario de Cenipalma en Zona Norte y las plantas extractoras de dicha región, la PC – HC afecta en la actualidad el 19 % del área sembrada en esta región, que equivale a cerca de 13 mil hectáreas, de las cuales 9 mil están concentradas en el departamento de Magdalena. De esta última cifra, se conoció que 2.208 hectáreas reportan incidencias superiores al 1 %, 3.370 hectáreas alcanzan niveles de incidencia

entre 0,15 % y 1 % y 3.389 hectáreas arrojaron niveles inferiores a 0,15 %.

Según la Coordinación de Manejo Sanitario de Cenipalma dichas estadísticas continuarán en aumento en la medida en la que no se implementen las prácticas de manejo continuo entre los productores de los sectores afectados. Entre las tareas a llevar a cabo están: los censos semanales y la eliminación inmediata de las palmas confirmadas.

Así mismo, la corrección prioritaria de las condiciones que en la región están permitiendo el establecimiento y diseminación eficiente del patógeno como:

- Asegurar el adecuado estado nutricional del cultivo respetando las recomendaciones del ingeniero agrónomo de la extractora.
- Construir y mantener, con adecuado criterio técnico, canales internos de drenaje en las fincas y eliminar la práctica de establecimiento de trinchos sobre los drenajes principales y naturales, condiciones responsables de generar nivel freático inferior al recomendado para la palma de aceite (1,2 metros) y permitir así las condiciones de humedad del suelo que necesita el microorganismo para diseminarse hacia nuevas palmas.

Debido a lo anterior, en la Zona Norte se creó un frente común para evitar la misma pérdida de palma de aceite como sucedió en Tumaco (Nariño), Puerto Wilches (Santander) y Cantagallo, (Bolívar), por cuenta de la PC, la cual llegó a ser de 70 mil hectáreas. En ese sentido, con la creación de la Mesa de Trabajo sobre la Pudrición del cogollo – Hoja clorótica, de la cual forman parte las direcciones agronómicas de todas las extractoras del departamento de Magdalena y entidades como el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, Cenipalma, Asotucurínca y Usoaracataca, se unificaron los criterios técnicos de manejo que requiere la enfermedad durante 2016.



Pudrición interna de palma disectada en finca La Coquera – Aracataca.

De acuerdo con la Coordinación de Manejo Sanitario de Cenipalma, el problema se debe asumir de manera conjunta, es decir, la enfermedad se debe manejar a nivel regional porque de nada sirve si un productor adopta todas las medidas de protección si en su vecindario existen predios que no lo hacen.

De ahí que en esta Mesa de Trabajo se analice permanentemente el panorama actual de la situación y se actualicen los criterios para el diagnóstico temprano de la enfermedad y su manejo, buscando fortalecer los procesos de cada censo con el fin de lograr la eliminación oportuna e inmediata de las palmas detectadas y la identificación de estrategias adicionales de prevención.

Tratar la problemática no es fácil. Primero, no cualquier amarillamiento es Hoja clorótica; segundo, para tener un panorama más amplio de la situación, se requieren de las mediciones tomadas en los censos fitosanitarios para que nos ayuden a saber cómo estamos y así estimar la efectividad de las medidas de manejo implementadas. Este es el insumo básico para tomar las respectivas medidas de ajuste.

De acuerdo con las proyecciones, de no adoptar las prácticas unificadas por la Mesa de Trabajo, para abril de 2017 se prevé que la incidencia se eleve al 5 %.

Para 2016 la proyección de incidencia registrada en las áreas afectadas fue 1,02 %.

“El llamado es a ejecutar acciones. Estamos a tiempo de actuar, es un buen momento para disminuir el riesgo epidemiológico que vivieron palmicultores en Tumaco y en Puerto Wilches. Entre las medidas que se pueden tomar está la capacitación a los censadores para fortalecer la capacidad de detección de la PC – Hoja clorótica y sus diferencias tanto con la PC clásica, como con otros disturbios tales como deficiencias nutricionales, daños de plagas y daños mecánicos, pudriciones en flecha incluso daños fisiológicos”, expresó Gabriel Torres, Especialista del Laboratorio del Área de Fitopatología de Cenipalma.



Demostración tala de palma a causa de PC – Hoja clorótica, finca La Julita – Magdalena. Foto: Luisa Gómez Rodríguez

Pese a la historia fitosanitaria que tiene el cultivo de la palma de aceite en las diferentes regiones del país, al parecer la Zona Norte no está exenta de las afectaciones que pueda generar la hoja clorótica. Por ello, palmicultores de la Zona Central realizaron una visita a las diferentes plantaciones de la Zona Norte, con el fin de conocer de primera mano el trabajo conjunto de los palmicultores y equipos técnicos de la costa, compartir experiencias acerca de la presencia de enfermedad, identificar sus síntomas y unificar los criterios técnicos de manejo que esta requiere.

Una de las visitas que se realizó fue a la finca La Julita, ubicada en el municipio de Aracataca, Magdalena, a la cual asistieron 26 profesionales palmeros y de entidades de las dos zonas productoras como el ICA, Cenipalma, Corpomag, y 19 propietarios y administradores de plantaciones de la Zona Norte.

El propietario de la finca, Marcos Daza, fue enfático al decir que de no concientizarse todos los palmicultores del sector sobre las consecuencias potenciales de esta enfermedad, habrá un daño económico y social en toda la región. "Es necesario hablar un solo idioma para evitar confusiones, además, hay agricultores que no le prestan atención a las enfermedades de los cultivos. Lo mejor es siempre seguir las recomendaciones que los expertos dan y comunicarse mucho con los productores vecinos y así no tener pérdidas en toda la región", puntualizó Daza.

Durante la reunión de cierre de esta gira a la Zona Norte, Rafael Martínez, uno de los anfitriones y Director Agronómico de Extractora Palmaceite S.A., expresó la importancia de que los productores sean conscientes de la necesidad de fortalecer las prácticas de manejo

agronómico y en especial, de manejo del agua en la región, ya que esta situación, además de debilitar fisiológicamente al cultivo, lo predispone a la incidencia de la enfermedad y permite su diseminación.

Finalmente, Adalberto Méndez, Presidente del Comité Agronómico Regional de la Zona Norte y Director Agronómico de la Extractora El Roble S.A.S., enfatizó que además de la corrección inmediata de estas condiciones predispuestas en la Zona Norte, es indispensable fortalecer permanentemente el proceso de censo para lograr detectar cada vez más temprano los casos nuevos y así darles el manejo oportuno que se requiere, aspecto en el que actualmente está trabajando la Mesa de Trabajo para definir los criterios de diagnóstico.





La mejor selección genética en palma

Todos los materiales tienen **pruebas genéticas y estadísticas** en Colombia y el mundo.

E. Guineensis (DxP) • Deli x La Mé * CIRAD* - DLM Millenium - DLM Advance - DLM El Dorado - DLM Elite **NOVED**
 • Deli x Yangambi * CIRAD* - DLY Generation

Híbrido (OxG) - Coari x La Mé Classic * CIRAD* - **Coari x La Mé Fortuna * CIRAD* NOVED**
 Alta extracción (23 - 25%)




Distribuidor exclusivo para Colombia, Centro América y El Caribe (DxP) - Brasil (OxG)
www.semillasdepalma.com • semillas@lacabana.com.co • Tel: (57 1) 310 0127 • Cel: 312 3043951

