

para T-3 (Braquiaria más bloque 25% de melaza - 25% de cachaza de tamiz); estas diferencias permiten determinar la positividad del reemplazo de la melaza por la cachaza, sin afectarse el incremento diario de peso.

Se encontró que la suplementación con Bloque Nutricional, mejoró el ambiente rumial, demostrando en los aumentos de Nitrógeno Amoniacal a niveles cercanos a los 200 miligramos por litro de fluido rumial para ambos tipos de bloques; lo que conlleva a la vez a los aumentos en las poblaciones de bacterias, levaduras y protozoarios, en orden de nivel de incremento respectivo y con un alto nivel de significancia.

Los consumos para el bloque nutricional (50% de melaza) fueron de 329 gr/día y para el bloque nutricional (25% de melaza —25% de cachaza de tamiz) fue de 288 gr/día, valores que se ajustan a los reportados de 700 gr/animal/día para adultos. Se atribuyó el menor consumo de bloque nutricional que contenía cachaza de tamiz, a la menor palatibilidad de este respecto a la melaza.

Con base en los anteriores resultados se han seguido efectuando otros análisis, determinando que se puede incluir en el bloque de cachaza de tamiz de palma de aceite, en reemplazo de melaza en la composición del bloque nutricional.

El trabajo de tesis fue orientado por el M.V.Z. M.Sc. Humberto Huertas. Director del Departamento de Nutrición del ICA. Centro Experimental "La Libertad". Villavicencio.

Noti-Bichos

"Sobre Malezas"

Tomado de: Notas y Noticias entomológicas -Noviembre-Diciembre/90

La Dra, Fanny Alvañil, de Fedepalma, colectó dos chinches sosobre malezas, en plantaciones de palma africana. Una de ellas, colectada en Villanueva (Cas.). fue determinada por el Dr. T.J. Henry, del SEL-PSI-USDA, como *Cebrenis* sp. (Hemiptera: Coreidae), y la otra, una chinche de encaje, fue colectada en Cumaral (Meta) e identificada por el Dr. R.C. Froeschner, del Instituto Smithsoniano en Washington, como *Acanthocheila armigera* (Stal) (Hemiptera: Tingidae).

Tercera Reunión del Comité Ejecutivo del Burotrop

El pasado 23 y 24 de abril se llevó a cabo la tercera reunión del Comité Ejecutivo del Burotrop en París, Francia.

Entre los temas tratados, se estudio el programa que desarrollará el Burotrop en el período 91-92 y las gestiones que esta Entidad ha venido desarrollando con algunos organismos internacionales que puedan colaborar en el desarrollo y financiación de proyectos de investigación en coco y palma.

Así mismo, se evaluó el seminario sobre coco que se realizó en Arusha, Tanzania (Africa), en el mes de marzo y el próximo seminario sobre palma de aceite que se realizará en Abidjan, Costa de Marfil, (Africa) entre el 10 y el 15 de junio de 1991, que busca identificar las prioridades de investigación en ese Continente de acuerdo con el concepto de cooperación horizontal entre los países en actividades de investigación en palma de aceite.

A dicha reunión ha sido invitada Fedepalma.

Es importante anotar que el Comité Ejecutivo acordó que en 1992 el Burotrop hará especial énfasis en Latinoamérica para lo cual está estudiando o campos en las cuales puede colaborar con los productores de oleaginosas perennes de esta región. Finalmente, el Director Ejecutivo de Fedepalma presentó nuevamente, en asocio con el IRHO, el proyecto sobre Pudrición de Cogollo. El Burotrop le dió todo su respaldo a esta iniciativa y la propuesta será presentada al programa STD III de la Comunidad Económica para tratar de obtener su financiación.

La proxima reunión del Burotrop se llevará a cabo en octubre del presente año.■