



Día de campo sobre método de muestreo y manejo de *sagalassa valida walker*.

El daño de *Sagalassa valida* es causado por la larva, que destruye el sistema radicular de la palma si no se aplica una medida de control oportuna; dicho daño se manifiesta en síntomas externos como la reducción del área foliar por acortamiento de las hojas y reducción del tamaño de los foliolos, amarillamiento apical de las hojas, secamiento prematuro de hojas bajas, caída de palmas por pérdida del anclaje, producción exagerada de inflorescencias masculinas, reducción del número y peso promedio de los racimos que se traduce finalmente en bajos rendimientos de fruta fresca ocasionando considerables pérdidas económicas.

A pesar de que Cenipalma ha reportado la importancia económica del daño de *Sagalassa valida* en la Zona Occidental, Oriental y Central, en las plantaciones de la Zona Norte se ha considerado sin importancia económica. Ahora, con las recientes evaluaciones se ha registrado su avance en la zona tanto en palma joven como en cultivos adultos; esta nueva situación amerita recordar a los técnicos y enseñar al personal de sanidad de las plantaciones el manejo del problema para evitar que el insecto se desarrolle como plaga de importancia económica.

Con la colaboración de su personal Técnico, el 11 de octubre en la plantación Palmas Montecarmelo Cenipalma desarrolló un día de campo sobre el método de muestreo y manejo de *Sagalassa valida* con el objeto de dar a conocer las características más importantes del daño causado por la larva del insecto, discutir los criterios técnicos para el muestreo de la plaga y del daño y, recordar las prácticas de manejo.

Participaron 38 personas de las siguientes plantaciones y empresas: Palmas Centro América, Palmas Abisinia, Hacienda Tukuy, Carbones del Caribe, Murgas y Lowe, Palmas de Casacara, Palmas Montecarmelo, Hacienda Las Flores, Aceites S.A., Finca Camito, Agropalestina, Hacienda La María, Palmag Ltda, Finca Macaraquilla, Coacol, Palmeiras, Extractora El

Roble y Hacienda Río Grande. En el campo los participantes pudieron identificar y diagnosticar palmas afectadas por *Sagalassa* según su sintomatología externa, observaron palmas con daño leve y severo del sistema radicular y su efecto sobre la producción de racimos; aprendieron a hacer los muestreos de raíces, a distinguir entre el daño fresco y viejo de las raíces que les permitirá diagnosticar la presencia o no de la larva en las raíces luego de una medida de control y, aprendieron a cuantificar el nivel de daño; los participantes también tuvieron la oportunidad de observar las prácticas de manejo más indicadas, como la inundación del lote y la cobertura del área del planteo con racimos vacíos o tusas. 🌴

